



expander



Miglioratore della forma e stimolatore della ramificazione per astoni di melo e pero in vivaio

Applicata localmente, la 6-benziladenina ad alta concentrazione possiede la capacità di ridurre l'effetto di dominanza esercitato dalle gemme apicali sulle restanti parti di giovani piante legnose in via di accrescimento.

Il risultato, su astoni di pero e melo non ancora in produzione, è lo sviluppo di germogli dalle gemme ascellari e quindi un maggior numero di rami prodotti nell'arco della stessa stagione vegetativa. Un ulteriore effetto secondario apprezzato dai vivaisti consiste nell'allargamento dell'angolo di inserzione dei rami neoformati sul fusto, con sveltimento delle operazioni di potatura e selezione dei rami da mantenere.





expander



Expander è una specialità ad alta concentrazione di 6-benziladenina messa specificamente a punto per applicazioni su astoni di melo e pero.

Sebbene l'etichetta consenta trattamenti anche mediante atomizzatore, l'esperienza maturata negli anni ha consentito di mettere a punto una tecnica basata su ripetute applicazioni mediante spruzzetta, con getto localizzato sulle gemme apicali delle giovani piante.

Il prodotto, formulato con i medesimi standards qualitativi del similare Brancher Dirado, è parimenti difeso per l'uso specifico in vivaio secondo quanto disposto dalle norme Europee ed è classificato secondo le più recenti norme vigenti in materia.

Composizione	6-benziladenina pura 9,35 % (=100 g/l)
---------------------	---

Formulazione	Soluzione acquosa
---------------------	-------------------

Registrazione	n° 10440 del 12/04/2000
----------------------	-------------------------

Titolare dell'autorizzazione	FINE Agrochemicals Ltd.
-------------------------------------	-------------------------

Classificazione	Pericoloso H314 e EUH401
------------------------	-----------------------------



Confezioni	flacone da litri 1 (cartone 6x1)
-------------------	----------------------------------



expander

**Culture registrate****Varietà trattabili**

Melo e pero in vivaio

Tutte le varietà ed in particolare quelle a medio o basso potere di ramificazione: es. *Abate Fétel*, *Conference*, *Golden Delicious*

Dosi di impiego

150-200 ml in 20 litri di acqua, da inserire in spruzzetta, serbatoio a pressione o altro erogatore simile

Epoche e modalità di impiego

Primavera-estate, con applicazioni a cadenza di 7-10 giorni localizzate mediante spruzzetta sulla gemma apicale, a partire da getti apicali con 6-10 cm di lunghezza

Suggerimenti:

- E' consigliata l'aggiunta di un bagnante-adesivante per favorire l'azione di contatto dell'Expander.
- Un buono stato vegetativo e nutrizionale degli astoni è condizione necessaria per l'applicazione.
- In caso di piogge dopo il trattamento si suggerisce di intervenire nuovamente nell'arco delle 24-48 ore.